



## കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ് കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 24.07.2024 മുതൽ 28.07.2024 വരെ)



### കണ്ണൂർജില്

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം  
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന്നന്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ - 59/2024

തീയതി: 23/07/2024

എ.പിനിട അഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡ്രത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
179.1	25.8 – 31.2	23.1 – 25.7	85 – 98	00 – 06

വി.വരുനാഞ്ചേർഡിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	24-07-2024	25-07-2024	26-07-2024	27-07-2024	28-07-2024
ശരാശരിമഴ, മി.മീ	15	8	10	10	7
കൂടിയതാപനില, °C	31	31	31	31	31
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	24	24	24	24	24
കൂടിയആപേക്ഷിക ആർഡ്രത, %	98	98	98	95	95
കുറഞ്ഞആപേക്ഷിക ആർഡ്രത, %	85	85	85	83	83
കാറിന്റെവേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	3	4	4	4	3
കാറിന്റെവിശ, ഡിഗ്രി	320	270	270	250	320
മേഘവിന്ധാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ		രൂപേട്ട അതിശക്തിയായ മഴ **	ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഡ്രത അനുഭവവെള്ളും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉള്ളാവ് സ്വാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും. ജൂലൈ 25 ന് രൂപേട്ട അതിശക്തിയായ മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 115.6 മില്ലിമുതൽ 204.4 മില്ലി വരെ) ജൂലൈ 23,24,26,27 ന് രൂപേട്ട ശക്തിയായ മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമുതൽ 115.5 മില്ലി വരെ)

	<p>കഴിയെന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശൈത്യമായ മഴയിൽ അമീതമായി വെള്ളരക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നീർ വാർച്ച അനുവദിക്കുക</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മത്തസൾ, കൊപ്പ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയില്ലത്തിട്ടുണ്ടുക.</p> <p>മുട്ടു കാണ്ടായ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശൈത്യമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p><b>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</b></p> <p>വളം, വിത്ത്, കാലിത്തറീറ്റകൾ എന്നിവ ഇന്ത്യൻ തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക</p> <p>കനുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്</p> <p>വൃക്ഷ വിളകൾ നടുന്നോൾ, ചെടികൾ തന്ത്രികയായ അകലം ഉറപ്പാക്കണം. മേൽ മണ്ണിന്റെ കുടെ ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതം ചെയ്യു വേണം കുഴികൾ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിറക്കാൻ. വർഷ കാലം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി തെക്കൾ നടാം.</p> <p>അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മഴയില്ലാത്ത ഇടവേളകൾ ലഭിക്കുന്നോൾ മാത്രം പശ ചേർത്തു കീടനാശിനി തളിക്കുക.</p>		
നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	കരിച്ചൽ/ചീച്ചൽ രോഗം	മുൻകരുതലായി സ്ഥിച്ചിൽ പാഡർ (എക്കരിന് 2 കിലോ) സുഷിരങ്ങളുള്ള കിഴികളിലാക്കി വെള്ളം കണ്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക
തെങ്ങ്/	തെക്കൾ	വെള്ളം കൈട്ടികിടക്കുന്ന അവസ്ഥ/കുന്നു ചീയൽ	തെക്കുഴികളിൽ അനുവദിക്കരുത്. കുഴികളിലേക്കു വെള്ളം ഔദിച്ചിരഞ്ഞാതിരിക്കാൻ കുഴികൾ ചുറ്റും വരുന്ന നിർമ്മിക്കുക. മഴയുടെ ഇടവേളയിൽ 1 % വേബർഡോൾ്സ് മിശ്രിതം ഹലകളിലും കുന്നിലും പശ ചേർത്ത് തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>കൊന്നൻ ചെള്ളി</p>  <p>ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകൾ പൊതുവെ കുടുതൽ ആക്രമണ വിധേയരാണ്</p>	<p>കൊന്നൻ ചെള്ളി :തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെള്ളിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് സർപ്പിക്കുക. ബോർഡോ കുഴന് കൊണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിറക്കുന്നത് മുൻവിൽ കുടി ഉണ്ടായെന്നാവുന്ന പുപ്പൽ ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>ഉപയോഗ സുന്ധാരായ മീൻ വലകൾ ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലും അര മീറ്റർ വിത്തിയിലും മുൻചെടുത്തു തെങ്ങിന്റെ മുന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ലെകവീഡുകളിൽ വിരിച്ചു നടുഭാഗത്തു ചെറുകളുടെ വച്ച് ഉൾഭാഗത്തെക്കു തളളി അമർത്തി വെക്കുക. ഓലത്തണ്ണിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തെക്കും പുറത്തെക്കു തുണി നിൽക്കുന്ന വലയുടെ വശങ്ങൾ നന്നായി വിടർന്നിരിക്കണം. പാറിവരുന്ന വണ്ണുകൾ കാലുകൾ വലയിൽ കുടുണ്ണി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാതെ നശിച്ചു പോകും, പുതു ലെകവ് വിടരുന്നതിനുസരിച്ച് വലമുകളിലോട് മാറി മാറി വെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.</p>

കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	പീച്ചൽ രോഗം 	<p><b>പീച്ചൽ രോഗം :</b> മുൻകരുതലായി തെടക്കേബാധിമ സന്പുഷ്ടമാകിയ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ശ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മഴുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രൈഡേ ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മഴു് കുതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ പീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.</p>
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലപുള്ളി രോഗം 	<p>രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ മുൻചു മാറ്റി തോട്ടത്തിനു വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചു കളയണം. മുൻചു മാറ്റിയ ഇലകൾ യാതൊരു കാരണവശാലിലും തോട്ടത്തിൽ ഇടരുത്. വാഴയിൽ കോൺടാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൽറ്റ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും (2 മിലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) തളിക്കുക.</p> <p>20% പൊട്ടാഷ് വളം അധികമായി നൽകുക.</p>
മഞ്ഞൾ	വിവിധ ഘട്ടം	തണ്ടുതുരപ്പൻ	<p>പ്ലുവൈൻഡയാമെല്ല് (ഹെയിം) 1 മിലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ രോള് ഇടവേളയിൽ 2-3 തവണ തളിച്ചു കൊടുക്കുക.</p>
കനുകാലികൾ	എല്ലാ പ്രായത്തിലും പെട്ടവ	പനി	<p>ആലകൾ വ്യത്തിയുള്ളതും ഇൻഡിപ്പരഹിതവു-മാക്കി വെക്കുക കുട്ടിപാണലിന്റെ ഇല പുകയ്ക്കുന്നതു പ്രയോജനകരമാക്കു.</p> <p>നടക്കുന്നേബാൾ മുടന്തുക, കണ്ണുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം ചാടുക, ഉയർന്ന ശരീരതാപനില എന്നിവ അസുഖം ബാധിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള അവസര- അളിൽ ഒട്ടു വെച്ചു താമസിപ്പിക്കാതെ, ഉടൻതന്നെ, വെറുന്നിനി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക.</p>
പരു/ആട്	വിവിധ ഘട്ടം	കുളന്തിൽ പഴുപ്പ്	<p>തൊഴുത്തിലും പുറത്തും വെള്ളം കെട്ടിന്ത്തിക്കാതെ സുക്ഷിക്കുക. അതോടൊപ്പം മുഗങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക. 0.2 % പൊട്ടാസിയം പെർമാംഗനേറ്റ് (2 ശ്രാം പൊട്ടാസിയം പെർമാംഗനേറ്റ് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച) ലായൻ ഉപയോഗിച്ച കുളന്തുകൾ വ്യത്തിയായി കഴുകി കോട്ടൻ തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കുക.</p>

പ്രസ്തുതി	കറവപ്പൾ	അകിട്ടു വീക്കം		രോഗം വരുന്നത് തടയാനായി പദ്ധതികളുടെയും പരിസരങ്ങളുടെയും ശുചിത്വം എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുക, കറവയന്ത്രം ഓരോ തവണയും ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞയുടെനെ കഴുകി സുക്ഷിക്കുക. പ്രാണിശല്യം നിയന്ത്രിക്കുക, പ്രസൂക്കൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ടോൺിക്കുകൾ നൽകുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മുഖ്യാശൂപ്രതിയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടുക. പ്രാരംഭപ്പെട്ടതിൽ തന്നെ ചികിത്സ നൽകിയാൽ രോഗം ധ്രൂവമായി നിയന്ത്രിക്കാം..
കോഴി/ താറാവ്	വിവിധ ഘട്ടം	അണുബാധ		കുടുകളുടെ തീയിൽ ഇന്റർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇന്റർപ്പം നിലനിന്നാൽ തീയിൽ വീഴുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കിൽ നിന്നും അമോൺ വാതകം പുറത്തേക്കു വരുക്കും.. അത് കോഴികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും.

\*\*മഴ അപായവർഷ്ണ സുചന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഇടന്നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്സാരം (നടപടികൾആവശ്യമില്ല)
---------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------

ഒപ്പ്/-  
നോയൽ ഓഫീസർ  
ഗാമിണ കൃഷികാലാവസ്ഥാവൈദ്യത്തി