

आजादी
का
अमृत महोत्सव



കാലാവന്ധാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

കോഴിക്കോട് ജില്ല

(പ്രാബല്യം: 06.08.2022 മുതൽ 10.08.2022 വരെ)



കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: : 06.08.2022 മുതൽ 10.08.2022 വരെ)



കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
 പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 62/2022

തീയതി: 05/08/2022

എ. പിനിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്യം

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
174.7	25.0 – 28.5	22.8 – 23.1	95 - 98	00 - 12

ബി. വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	06-08-2022	07-08-2022	08-08-2022	09-08-2022	10-08-2022
മഴ, മി.മീ	45	18	14	20	28
കൂടിയ താപനില, °C	27	28	29	29	29
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	23	24	24	24	24
കൂടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	98	98	98	98	98
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	94	94	94	94	94
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	6	12	10	10	8
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	250	270	290	270	270
മേലു വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
രുചൈട്ട് കനത്തമഴ**			
<u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u>	<p>രുചൈട്ട് കനത്ത മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 115.5 മില്ലി വരെ) ലഭിക്കും വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്യും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും മഴ കാരണം അന്തരീക്ഷ ഉള്ളാവ് സാധാരണയിലും താഴെ ആയിരിക്കും</p>		

		<p>ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര പുഷ്ട രോഗം പടരാൻ കാരണമാകും. ചീച്ചൽ, വാട്ട് എന്നി രോഗങ്ങൾ, തെങ്ങ്, കമുകു, കുറുമുളക്, റബ്ബർ, ഇഞ്ചി, വാഴ എന്നീ വിളകൾക്ക് പടരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത വിളകൾക്ക് താഴെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക.</p>	
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ		<p>വിണുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിക്കു നശിപ്പിക്കണം. തോട്ടങ്ങളിൽ നല്ല നീർ വാർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുക.</p> <p>വിളകൾക്ക് വളപ്പെയോഗം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. വിളകളുടെ വളർച്ചാഫട്ടം അനുസരിച്ച് വളം നൽകുക. വുക്കൾ വിളകൾക്ക് ഇതുവരെ നനാം ശഡു വളപ്പെയോഗം നടത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഉടനെ പുർത്തീകരിക്കുക.</p>	
നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>എല്ലാ ജല നിർഗമന ചാലുകളും തുറക്കുക. ശക്തമായ മഴ മാറിയ ഉടനെ തന്നെ ബീംപിംഗ് പെട്ടവർ നീച്ച സുക്ഷ്മ സുഷ്ഠിരങ്ങളുള്ള ബാഗുകൾ പാടത്തെക്കു വെള്ളം പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിക്ഷേപിക്കുക</p>	
നെല്ല്	പരിച്ചു നട്ടിടങ്ങൾ	<p>ഓല ചുരുട്ടി പുഴു</p> 	<p>ഓല ചുരുട്ടി പുഴു ആക്രമണം ഉണ്ടക്കിൽ മുള്ളുള്ള കമ്പു വലിച്ചു ഓലപുരുളുകൾ തുറക്കുക.</p> <p>ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാം ഒരു ദിവസം 2 മീലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>
നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ഇലപ്പുള്ളി രോഗം</p> 	<p>മുൻ കരുതലായ് പ്രസ്തുതോമോണാസ് ഫ്ലൂറസിസ് (20 ശ്രാം രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) തളിക്കുക</p> <p>രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നാറീവോടു കൂടിശ്ശീ നാശിനി 4 ശ്രാം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക തളിക്കുക</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>പുതുതായി തെരു നട തടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിർക്കാതെ സുക്ഷിക്കുക. തെക്കുചീളകളുടെ അക്കത്തെക്കൾ വെള്ളം പെട്ടിനിങ്ങാതവെള്ളം വകിൽ വരുന്നുകൾ തീർക്കുക. ശക്തമായ മഴ മാറിയ ഉടനെ തന്നെ തെങ്ങിൻ തടത്തിലെ മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൂടാതെ മണ്ണ് ഇളക്കുന്ന സമയത്തു കുമ്മായം വിതരുന്നത് അണു നശിക്കരണത്തിനു സഹായകമാകും</p>	
തെങ്ങുശ്ശപട്ട യുള്ള വുക്കൾ വിളകൾ	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ഗാനോധർമാ വാട്ട്</p> 	<p>വിളകളുടെ തടയിൽ കാണുന്ന കുണ്ണ് പോലുള്ള പുഷ്പലിംഗം ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യു ഷൈൽക്കാണ്സോൾ (3 മീലി രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) ലായനി പുരട്ടുക. ഇതേ രീതിയിൽ തയ്യാറാകിയ ലായനി തടത്തിലും നന്നായി കുതിർക്കുക.</p>

കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	പീച്ചൽ രോഗം 	മുൻകരുതലായി ദൈനംദിനം സമ്പൂഷ്ടമാക്കിയ വേഴ്സിൻ പിസ്റ്റാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം (നേര്ത്തവാഴ)	കട ചീയൽ 	മുൻകരുതലായി ദൈനംദിനം സമ്പൂഷ്ടമാക്കിയ -ചാണകം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.
കവുങ്ങ്	കായ്യുന്ന ഘട്ടം	മഹാജ്ഞി 	രു ശതമാനം വീരമുള്ള ബോർഡേയാ മിശ്രിതം കുപകളിലും ഇലകളിലും തളിച്ച് കൊടുക്കുക.
വിളകളും വളർത്തു മുഖങ്ങളും	വിവിധ ഘട്ടം	ആഫ്രിക്കൻ ഷച്ച് 	<p>ഷച്ചകളെ ആകർഷിച്ച് പിടിക്കുവാനായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നന്നതെ ചണ ചാക്കുകളിൽ കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, പഷ്ടായ എന്നിവയുടെ ഇലകൾ നിറച്ച് വിടിനു ചുറ്റും വരക്കുക. ഇവയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഷച്ചകളെ 200 ഗ്രാം ഉപ്പു രൈറിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ ഇട്ടു നശിപ്പിക്കുക.</p> <p>വിളകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷച്ചകളെ നശിപ്പിക്കാനായി 0.3 ശതമാനം വീരമുള്ള തുരിൾ (3 ഗ്രാം കോപ്പർ സർഫേസ് രു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ) ലായനി തളിക്കുക. തുരിൾ ലായനിയുടെ വീര്യം ധാരാരു കാരണവശാലും അധികാരിച്ചാൽ വിളകൾക്ക് പൊളിലും കഷിനവും ഉണ്ടാകും.</p>
കനുകാലികൾ	വിവിധ ഘട്ടം	കനുകാലി കുട് ഇൻഷമിസ്റ്റാതെയും വൃത്തിയായും സുകഷിക്കുക. കനുകാലി കുടിന്റെ തര തേങ്ങാ തൊണ്ടു ഉപയോഗിച്ച് ഇടവിട്ടു പുകയ്ക്കയാണെങ്കിൽ തര ഇന്ത്രപരഹിതമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കും . കുടകു പുകയ്ക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് പശുക്കളെ സുരക്ഷിതമായ മറ്റാരു സ്ഥലത്തെക്ക് മാറ്റുന്നോൾ വേണ്ട ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം .	

**മഴ അപായ വർഷ സുചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗര (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്താരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
---------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------------------

മേഖല ഓഫീസർ
ഗവർണ്ണറിന്റെ കുഷ്ഠികാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി